

附件 5: 夏枯全草中药标准 (征求意见稿)

夏枯全草

Xiaku Quancao

PRUNELLAE VULGARIS HERBA

【来源】 本品为唇形科植物夏枯草 (*Prunella vulgaris L.*) 的干燥全草。夏季采收, 除去杂质, 晒干。

【炮制】 取夏枯全草饮片, 称重, 照压制法 (《四川省中药饮片炮制规范》2015 年版附录 I), 压制成块。

【性状】 呈一定形状的块, 浸泡、润软, 完全展开后同《四川省中药饮片炮制规范》(2015 年版) 夏枯全草饮片。

【鉴别】 取本品粉末 1g, 加乙醇 20ml, 加热回流 1h, 滤过, 滤液蒸干。残渣加石油醚 (30~60℃) 浸泡 2 次, 每次 15 ml (约 2 min)。倾去石油醚液。残渣加乙醇 1 ml 使溶解, 作为供试品溶液。另取熊果酸对照品, 加无水乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液, 作为对照品溶液。照薄层色谱法 (《中国药典》2025 年版四部通则 0502) 试验, 吸取上述两种溶液各 2 μ l, 分别点于同一硅胶 G 薄层板上, 以环己烷-三氯甲烷-乙酸乙酯-冰醋酸 (20:5:8:0.5) 为展开剂, 展开, 取出, 晾干。喷以 10% 硫酸乙醇溶液, 在 100℃ 加热至斑点显色清晰。分别置日光灯及紫外光灯下 (365nm) 下检视。供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点和荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0% (《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 13.0% (《中国药典》2025 年版四部通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 4.0% (《中国药典》2025 年版四部通则 2302)。

重量差异 取供试品 10 块, 称定总重量, 求得平均重量, 分别称定每块重量。每块重量与标示重量比较 (无标示重量的与平均重量比较), 按下表中的规定, 超出重量差异限度的不得多于 2 块, 并不得有 1 块超出限度 1 倍。

标示重量或平均重量	重量差异限度
5 g 及 5 g 以下	$\pm 12\%$

5 g 以上至 10 g	±10%
10 g 以上	±8%

【性味与归经】 辛、苦，寒。归肝、胆经。

【功能与主治】 清火，明目，散结，消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，癭瘤，乳痈肿痛。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处。

【药材收载标准】 《四川省中药材标准》（2010年版）。

德安堂